

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przechowywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skret szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności



Wpisany przez Administrator
czwartek, 23 stycznia 2020 14:43

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki biosekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Ważnym jest od wypuszczenia ptaków na wybieg i pozostawienie ich w budynkach, w których są utrzymywane;
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz, prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne w województwie lubuskim

PW w Gorzowie Wlkp.	95 720 20 72
PW w Krosinie Odrz.	68 383 51 73
PW w Międzyrzecz	95 741 22 38
PW w Nowej Soli	69 458 38 58
PW w Ostrołęce	95 757 40 50
PW w Ostrołęce Kuj.	95 763 10 58
PW w Sulejówce	95 755 00 40
PW w Świdwinie	68 382 25 54
PW w Zielonej Górze	68 453 73 24
PW w Żaganiu	68 477 54 77
PW w Żarach	68 372 04 40
PW we Wschowie	68 356 51 00

WOJEWODA LUBUSKI

PORADNIK OGÓLNY

GRYPA PTAKÓW

opracowano na podstawie komunikatów
 Głównego Lekarza Weterynarii
 oraz
 Głównego Inspektora Sanitarnego

Wydawnictwo: 2014
 Wydawnictwo: 2014
 Wydawnictwo: 2014

Plasja grypy

Plasia grypy, *influenza ptaków* - ostro choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W ścierkach wodnych, czynie zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

Plasia grypy występuje na całym świecie i występuje gwałtownie na podłożu zaradzie się wirusom, choć niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Do tej pory zidentyfikowano ponad 140 szczepów wirusa. Wskazano z nich to odmienny biologicznie i patologicznie (ang. *Low Pathogenic Avian Influenza* (LPAI). Mimo tego może się dwa szczepy (H5 i H7), które mogą przyczynić się do dużej śmiertelności wśród drobiu - szczepy o wysokiej patogeniczności (ang. *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI).

W ostatnim czasie (październik - grudzień 2016 r.) na terenie Europy po raz kolejny potwierdzono wystąpienie ognisk zakażeń wirusem wysoce patogennym grypy ptaków typu A (H5N1). Do zakażenia doszło zarówno u ptaków dzikich, jak i drobiu oraz u ptaków w ZOO (Holandia). Przypadek zakażenia stwierdzono m.in. w Węgry, w Austrii,

Niemczech, Chorwacji, Dani i Szwajcarii, a także w Holandii i Polsce.

Wirus wystąpił w Europie już wcześniej (na przełomie 2014/2015 roku) i jego nieprzetrzymanie również było związane z intensywnymi migracjami ptaków dzikich. W porównaniu z ówczesnym okresem obecnie notuje się wyższą zachwalność i śmiertelność w populacji drobiu wodnego.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem grypy typu A (H5N1) u ludzi i ocenia się, że ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka jest bardzo niskie. Analizy genetyczne wirusa wskazują, że wirus nadal jest głównie wirusem ptasim, bez szczególnego powinowactwa do człowieka.

Istnieje szereg faktów, że wirus należy do grupy wirusów H5N1 i jest genetycznie spokrewniony z wirusami H5N1 i H5N6, które były przyczyną zakażeń u ludzi, nie można wykluczyć możliwości zakażenia człowieka również i tym wirusem. Dlatego też w przypadku przewidywania i zapobiegania infekcji należy unikać bezpośredniego kontaktu z ptakami i produktami pochodzącymi od ptaków (np. mięs, jaj, mleka, lekarstwa, przetworzonej karmy, mięsa, skóry i obojętne między drobiu) i stosować właściwe środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego układowego oraz zachować higienę rąk.

Ponadto zaleca się, aby osoby pracujące na fermach, w których wystąpiły przypadki zakażeń u ptaków lub mające bezpośredni kontakt z zakażonymi ptakami dzikimi, prowadziły monitoring stanu swojego zdrowia przez 10 dni pod kątem wystąpienia objawów infekcji. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

UWAGA!!!

W związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A (H5N1) został wprowadzony zakaz targowiskowej sprzedaży drobiu i jaj konsumpcyjnych na terenie zapowietrzonym (3km od ogniska) i zagrożonym (10 km od ogniska). Drób i jaja należy kupować w sklepach i sklepikach. W sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie jaja oznakowane, bądź w miejscu sprzedaży powinny się znajdować takie dane jak nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą lub imię, nazwisko i adres producenta jaj.

OBJAWY KLINICZNE

wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

- zwiększona śmiertelność;
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy narowowe:
 - skrzydła,
 - paraliż nóg i skrzydeł,
- niezdolność ruchów;
- duszność;
- śluznica;
- wybroczyny;
- biegunki;
- nagły spadek nieśności