Zgodnie z wytycznymi MSWiA oraz Wojewody Lubuskiego Gmina Bytom Odrzański realizuje niezbędne działania w zakresie przygotowania do dystrybucji tabletek jodku potasu.
Tabletki te są już w Bytomiu Odrzańskim, a ich wydawanie rozpocznie się wyłącznie w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

Tabletki będą wydawane w miejscach w których zwyczajowo zlokalizowane są komisje wyborcze i w Przedszkolu Publicznym. Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom dorosłym. Za podanie ich dzieciom będą odpowiedzialni wyłącznie ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu w Bytomiu Odrzańskim:

1. Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 9.
2. Szkoła Podstawowa, ul. Kożuchowska 15.
3. Przedszkole Publiczne, ul. Dworcowa 19.


Profilaktyka jodowa
Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

- dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu);
- dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu);
- dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu);
- noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu);
- kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Prosimy o przeczytanie ulotki informacyjnej tabletek jodku potasu załączonej poniżej.




Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem
Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.
Kiedy nie przyjmować leku?
jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli masz nadczynność tarczycy
jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa)
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAŻAJ, JEŚLI:
stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
jesteś odwodniony
przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę
PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA
przed przyjęciem leku
w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia
w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)
po przyjęciu leku
z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy
DODATKOWE INFORMACJE
Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa
Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu
rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl
JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Zdrowia
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych